

Critères pour cibler les patients à risque élevé de complications liées à la grippe

Personnes à risque élevé de complications liées à la grippe notamment :

- Les adultes (y compris les femmes enceintes) et les enfants atteints des maladies chroniques suivantes :
 - maladie cardiovasculaire;
 - maladie respiratoire (asthme, BPCO, p. ex.);
 - diabète ou autre maladie métabolique;
 - cancer, immunodéficience, immunodépression (en raison d'une maladie sous-jacente ou d'un traitement);
 - néphropathie;
 - obésité morbide (IMC \geq 40);
 - anémie ou hémoglobinopathie;
 - affections compromettant l'évacuation des sécrétions respiratoires.
- Les enfants et les adolescents qui :
 - souffrent de troubles neurologiques ou de neurodéveloppement y compris des troubles épileptiques, des crises hyperpyrétiques et un retard du développement;
 - sont traités à l'acide acétylsalicylique sur de longues périodes.
- Tous les résidents de centres d'accueil ou d'autres établissements de soins aux malades chroniques
- Les personnes âgées de 65 ans ou plus
- Les femmes enceintes
- Les enfants de 6 mois à 59 mois
- Les Autochtones

Personnes pouvant transmettre la grippe aux personnes à risque élevé de complications notamment :

- Les fournisseurs de soins de santé dans les établissements et dans la collectivité
- Les contacts familiaux avec des personnes à risque élevé, y compris les enfants de 59 mois ou moins
- Les membres d'une famille attendant la naissance d'un enfant durant la saison grippale
- Les femmes à toutes les étapes de la grossesse et les mères qui allaitent
- Les personnes qui ont régulièrement soin d'enfants de 0 à 59 mois
- Les personnes qui fournissent des services à des personnes à risque élevé dans un milieu fermé

| Médicaments indiquant la présence d'un risque élevé** | | |
|---|----------------|-------------|
| Amlodipine | Insuline | Salbutamol |
| Clopidogrel | Lisinopril | Vérapamil |
| Digoxine | Metformine | Warfarine |
| Diltiazem | Nitroglycérine | Salmétérol |
| Énalapril | Prednisone | Ipratropium |
| Fosinopril | Quinapril | Ritonavir |
| Glyburide | Ramipril | |

** Pour une liste plus détaillée des médicaments et affections indiquant la présence d'un risque élevé chez les patients, voir l'annexe A.

Ces médicaments ont été sélectionnés en raison de leur fréquence d'utilisation et de leur indication pour des maladies à risque élevé; le salbutamol, par exemple, a été choisi en tant qu'indicateur de la présence d'asthme ou de BPCO. Vous pouvez ainsi cibler la plupart des patients atteints d'une de ces maladies et avoir moins de médicaments à rechercher.

Autres personnes :

- Les personnes assurant des services essentiels dans la collectivité.
- Les personnes en contact direct avec de la volaille infectée par le virus de la grippe aviaire durant les activités d'abattage.
- Les voyageurs même s'ils n'appartiennent pas aux groupes prioritaires ci-dessus.
- Tous les Canadiens âgés de 6 mois et plus ne présentant pas de contre-indications au vaccin contre l'influenza sont encouragés à se faire vacciner même s'ils ne font pas partie des groupes ci-dessus, car ils peuvent bénéficier de la protection contre la grippe.

Personnes à ne pas vacciner :

- Les personnes ayant eu une réaction anaphylactique après l'administration d'une dose du vaccin antigrippal par le passé ou ayant réagi à toute composante du vaccin (sauf les œufs) ou ayant présenté le syndrome de Guillain-Barré dans les six semaines suivant la vaccination contre l'influenza ne doivent pas recevoir de nouvelle dose.



C'est un fait

Le VVAI présente plusieurs avantages pour les enfants dont l'administration sans aiguille.