

Les renseignements fournis visent à aider les prescripteurs à sélectionner un agent de remplacement de la classe des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. La posologie doit être adaptée à chaque patient afin d'assurer un contrôle optimal de son état de santé. Une surveillance étroite de la tension artérielle, du potassium et de la fonction rénale peut être requise durant la période de transition.

Médicament	Indication	Dose initiale	Dose d'entretien habituelle	Dose quotidienne maximale recommandée	Produits à entité unique	Produits combinés
Azilsartan	Hypertension	20 mg une fois par jour ^{a,b,c}	40-80 mg une fois par jour	80 mg	40 mg, 80 mg	azilsartan/chlorthalidone: 40/12.5 mg, 80/12.5 mg, 40/25 mg
Candésartan	Hypertension	8 mg une fois par jour ^{a,b}	8-32 mg une fois par jour	32 mg	4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg	candésartan/HCTZ: 16/12.5 mg, 32/12.5 mg, 32/25 mg
	Insuffisance cardiaque	4 mg une fois par jour ^a	Doubler la dose à intervalles de 2 semaines, en fonction de la tolérance du patient, afin d'atteindre la dose cible de 32 mg une fois par jour.	32 mg		
Éprosartan	Hypertension	600 mg une fois par jour ^{a,b,c,d}	600 mg une fois par jour	600 mg	400 mg, 600 mg	éprosartan/HCTZ: 600/12.5 mg
Irbesartan	Hypertension	75 mg une fois par jour ^{a,b}	150-300 mg une fois par jour	300 mg	75 mg, 150 mg, 300 mg	irbesartan/HCTZ: 150/12.5 mg, 300/12.5 mg
	Néphropathie diabétique	150 mg une fois par jour ^a	300 mg une fois par jour	300 mg		
Losartan	Hypertension	25 mg une fois par jour ^{a,b}	50-100 mg une fois par jour ^a	100 mg	25 mg, 50 mg, 100 mg	losartan/HCTZ: 50/12.5 mg, 100/25 mg
	Néphropathie diabétique	50 mg une fois par jour ^a	50-100 mg une fois par jour, selon la TA	100 mg		
	Insuffisance cardiaque (≥60 ans) (emploi non approuvé par Santé Canada)	12,5 mg une fois par jour ^a	50 mg une fois par jour	100 mg		
Olmésartan	Hypertension	20 mg une fois par jour ^{a,b}	20-40 mg une fois par jour	40 mg	20 mg, 40 mg	olmésartan/HCTZ: 20/12.5 mg, 40/12.5 mg or 40/25 mg
Telmisartan	Hypertension	40 mg une fois par jour	40-80 mg une fois par jour	80 mg	40 mg, 80 mg	telmisartan/HCTZ: 80/12.5 mg, 80/25 mg
	Réduction du risque cardiovasculaire	80 mg une fois par jour	80 mg une fois par jour	80 mg		
Valsartan	Hypertension	80 mg une fois par jour ^{a,b}	80-320 mg une fois par jour	320 mg	40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg	valsartan/HCTZ: 80/12.5 mg, 160/12.5 mg, 160/25 mg
	Insuffisance cardiaque	40 mg BID	Porter la dose à 80 mg BID après 2 semaines, puis à 160 mg BID si le patient le tolère	160 mg		
	Après un IM	Commencant au moins 12 heures après l'IM : 20 mg BID si le patient est cliniquement stable, avec surveillance étroite de la tension artérielle	Porter la dose à 40 mg BID en l'espace de 7 jours, puis l'augmenter graduellement selon la tolérance du patient jusqu'à la valeur cible de 160 mg BID	160 mg BID En général, avec des bêtabloquants.		

^a En monothérapie dans le traitement de l'hypertension chez les patients qui n'ont pas de facteurs de risque additionnels, comme une insuffisance rénale, un dysfonctionnement hépatique, une insuffisance cardiaque, le grand âge ou la prise concomitante de diurétiques.

^b En cas de déplétion volumique, comme chez les patients sous diurétiques, corriger d'abord la déplétion volumique avant d'administrer le traitement, ou commencer par l'administration d'une faible dose initiale.

^c Ajuster la dose initiale chez les personnes âgées.

^d Chez certaines personnes, l'effet antihypertenseur peut diminuer vers la fin d'un intervalle posologique de 24 heures. Pour remédier à cet effet, on peut envisager d'augmenter la dose quotidienne unique ou de fractionner la dose quotidienne en 2 doses égales administrées à 12 heures d'intervalle.

Abréviations : HCTZ = hydrochlorothiazide; IM = infarctus du myocarde; TA = tension artérielle

Renseignements adaptés de Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (monographie de l'APhC) et Hypertension, disponibles sur www.monrxtx.ca.